

Leflunomide (Arava)

Uw behandelend arts heeft U leflunomide voorgeschreven. Hierbij treft u informatie aan over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt U daarmee altijd bij de arts terecht.

Werking

Leflunomide is een nieuw medicijn, dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van reumatoïde artritis. Het onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor ontstekingsverschijnselen zoals pijn en stijfheid van gewrichten. Het heeft een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsbeschadigingen.

Leflunomide werkt langzaam. Het kan vier tot zes weken duren voor het effect merkbaar wordt. Uw arts zal U dan ook meestal adviseren naast leflunomide andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik

Leflunomide wordt toegediend in tabletten van 10 of 20 mg.

De eerste drie dagen is er sprake van een begindosering, waarna een onderhoudsdosering volgt. Uw arts schrijft U de juiste dosis voor. De tabletten moeten in hun geheel worden ingenomen, liefst met water. Leflunomide kan tijdens of tussen de maaltijden door worden ingenomen.

Mogelijke bijverschijnselen

- Gewichtsverlies (in het algemeen gering)
- Maag-of darmklachten: vol gevoel, misselijkheid, diarree, buikpijn
- Hoofdpijn, duizeligheid
- Huiduitslag, droge huid, vermeerderde haaruitval

- Zweetjes in de mond
- Verhoging van de bloeddruk (in het algemeen mild)
- Leverfunctiestoornissen
- Stoornis in de aanmaak van witte bloedcellen, rode bloedcellen of bloedplaatjes.

Uw arts zal uw bloeddruk controleren. Controle van de bloeddruk dient in het begin regelmatig plaats te vinden. Door regelmatig het bloed te onderzoeken, kunnen vroegtijdig tekenen van leverfunctiestoornis of van stoornis in de aanmaak van bloedcellen worden opgespoord. Houdt u daarom goed aan de afspraken voor bloedcontroles. Waarschuw altijd de reumatoloog of huisarts als u last krijgt van hoge koorts en infecties of als spontaan blauwe plekken optreden.

Aanvullende informatie

- Wees voorzichtig met alcohol. In combinatie met leflunomide wordt het risico op leverfunctiestoornissen verhoogd. Alcoholgebruik wordt afgeraden.
- Leflunomide kan invloed hebben op ei- en zaadcellen. Daarom wordt geadviseerd om gedurende de behandeling voor een goede, betrouwbare anticonceptie te zorgen. Indien u een zwangerschap overweegt, overleg dan eerst met uw arts.
- Gebruik leflunomide niet als u borstvoeding geeft.
- Leflunomide blijft lang in het lichaam. Bij bijwerkingen kan uw reumatoloog zo nodig medicijnen voorschrijven waardoor het versneld uit het lichaam verdwijnt.

Als u bloeddonor bent raden wij u aan voor overleg contact op te nemen met de bloedbank en uw aandoening en medicijngebruik te melden. Zeer waarschijnlijk zult u uw donorschap moeten staken.