

Salazosulfapyridine, sulfasalazine (Salazopyrine EC)

Uw behandelend arts heeft U sulfasalazine voorgeschreven. Hierbij treft u informatie aan over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt U daarmee altijd bij de arts terecht.

Werking

Sulfasalazine (ook wel SASP genoemd) onderdrukt het ziekteproces en vermindert daardoor zwelling en pijn van gewrichten. Het heeft een remmend effect op het ontstaan van gewrichtsafwijkingen. SASP werkt langzaam. Het kan vier tot tien weken duren voor het effect merkbaar wordt. Uw arts zal U dan ook meestal adviseren naast SASP andere pijnstillende en ontstekingsremmende middelen te gebruiken.

Gebruik

SASP wordt toegediend in tabletten van 500 mg. Tijdens de eerste vier weken van uw behandeling zal de voorgeschreven hoeveelheid SASP wisselen. De arts vertelt wat voor u het meest geschikte schema is. Om bijverschijnselen zo veel mogelijk te beperken kunt u de tabletten het best tijdens de maaltijd innemen. Slik de tabletten in hun geheel door. SASP is bestand tegen maagsappen.

Mogelijke bijverschijnselen

U kunt last krijgen van:

- Misselijkheid
 - Hoofdpijn, duizeligheid
 - Huiduitslag, jeuk
 - Pijnlijk mondslijmvlies, zweertjes in de mond
 - Blauwe plekken
 - Keelpijn
 - Koorts
 - Geelzucht: t.g.v. een stoornis van de leverfunctie
 - Depressieve gevoelens
- } t.g.v. stoornissen in de aanmaak van het beenmerg

Indien één of meerdere van deze verschijnselen bij u optreden, neem dan contact op met de arts.

Een enkele keer kan het gebeuren dat het aantal witte bloedlichaampjes sterk daalt. Dan treden keelpijn en koorts op. U dient dan meteen de arts te waarschuwen. Die kan via bloedonderzoek zien of u een griepje onder de leden hebt of dat er inderdaad sprake is van een daling van het aantal witte bloedlichaampjes. De kans op deze ernstige bijwerking is er met name in de eerste drie maanden dat u sulfasalazine slikt. Door regelmatig bloedonderzoek kunnen vroegtijdig tekenen van remming van beenmerg of leverfunctiestoornissen worden opgespoord. Houdt u daarom goed aan de afspraken voor bloedcontrole.

Aanvullende informatie

- SASP kan uw urine oranje-rood kleuren. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.
- Er is tot nu toe weinig bekend over de invloed van SASP op de voortplanting. Overleg daarom altijd met de arts indien u een zwangerschap overweegt. De medicatie kan dan eventueel worden aangepast of vervangen. N.B.: Dit geldt ook voor mannen. SASP kan bij mannen tijdelijk onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit verdwijnt weer na stopzetten van de medicatie.
- SASP werd in de jaren veertig oorspronkelijk ontwikkeld als geneesmiddel tegen zowel reumatoïde artritis (RA) als chronische darmontstekingen. Tegen RA leek het middel aanvankelijk niet effectief. Pas in de jaren zeventig bewees het na hernieuwd onderzoek zijn nut bij de behandeling van chronische reuma.

Als u bloeddonor bent raden wij u aan voor overleg contact op te nemen met de bloedbank en uw aandoening en medicijngebruik te melden. Zeer waarschijnlijk zult u uw donorschap moeten staken.